

WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD 18 MONTHS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE		

유년기 초기 (18 개 월)							
	아동의 이름			I고 온 사람		생년월일	
	알레르기 문제			현재 복용하고 있는 약품			
무	지난 방문 이후의 질병/사고/문제	 ᅨ/염력사항 등			오늘 질문한 사항:		
ᆥ							
후							
			-1.1-				
아동의	에 아니오 스스로 식사를		아니오 "ㅂ	h이 바이"하면서	손을 흔듭니다		
6						-ı	
	20개 낱말을 말할 수 있습니다					¬,	
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE HEIGHT C	M/IN. PERCENTILE HEAD CIR. PERCE		Diot			
				Diet			
Re	eview of systems	Review of family history	E	Elimination			
			s	Sleep			
				Review Immunization Record Lead Exposure			
Screen				Fluoride Supplements Fluoride Varnish			
Hearin	g <u></u>		_	Hct/Hgb TB Dental Referral			
Vision							
Develo	pment: Circle area of cond	bern		Health Education: (Check all discussed/handouts given)			
Adaptive/Cognitive Language/Communication				Nutrition/Feeding Toilet Training Safety			
Gross	Motor Social/E	motional Fine Motor		Development Car Seat or Booster Seat Teeth Care			
Behavi	or			Passive Smoking Discipline/Limits Child Care			
Mental	Health			Bedtime Routine			
Physic	al: N A	N	Α	Other:			
Genera	al appearance	Chest		Assessment/Plan			
Skin		Lungs		SSESSITIETIVI TATI			
Head		Cardiovascular/Pulses					
-	Cover/Uncover	Abdomen					
Ears		Genitalia					
Nose		Spine	H				
Neck	arynx/Teeth	Extremities	H -				
Nodes		Neurologic Gait	HI -				
Descri	pe abnormal findings and c	omments.	_				
			-				
			IMI	MUNIZATIONS GI	IVEN		
			— RE	FERRALS			
			ALTI DEC. (15.55	NA NA F			
	NEXT VISIT: 2 YEA	RS OF AGE	HE	ALTH PROVIDER	(NAME		
HEALTH	HEALTH PROVIDER SIGNATURE			HEALTH PROVIDER ADDRESS			
DSHS 13-684 KO (REV. 08/2004) SEE DICTATION							

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Early Childhood (18 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Tuberculosis Screen

Screen for these risk factors:

- Members of household with tuberculosis or in close contact with those who have the disease.
- Close contact with recent immigrants or refugees from countries in which tuberculosis is common (e.g., Asia, Africa, Central and South America, Pacific Islands); migrant workers; residents of correctional institutions or homeless shelters or persons with certain underlying medical disorders.

Hepatitis B Vaccine

For children and adolescents not vaccinated against hepatitis B in infancy, begin the hepatitis B vaccine series
during any childhood visit. Give the second dose at least one month after the first dose and give the third dose
at least four months after the first dose and at least two months after the second dose.

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No			
		Walks backward.		
		Points to 2 body parts ("show me your nose, eyes," etc.).		
		Drinks from a cup.		
		Imitates household chores such as sweeping.		
		Uses 20 words.		
		Understands the meaning of "Get up " or "Sit down."		
		Stacks 2 blocks.		
		Scribbles.		
 Avoids eye contact. Persistent rocking, hand flapping, head banging or toe walking. No single word by 16 months. 				

Instructions for developmental milestones: At least 90% of children should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on any two items or *even one* of the underlined items, or any of the **boxed items** (abnormal behavior at this age), refer the child for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



건강진단 - 유년기 초기 (18기월) WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD 18 MONTHS (EPS

ANET CHIEDHOOD TO MONTHS	날싹
SDT 지침 준수)	

	유년기 초기 (18 기 욀)					
	아동의 이름		아기를 데리			생년윌일
	알레르기 문제			현재 복용하고 있는	약품	
<mark>유</mark> 작성한	지난 방문 이후의 질병/사고	/문제/염려사항 등		S	오늘 질문한 사항:	
<u>8</u>		에 사를 합니다 을 말할 수 있습니다		·이 바이"하면서 손 단한 지시사항을 '	을 흔듭니다. 파라할 수 있습니다	t.
체중 KG./OZ	. 백분울 신장 C	M/IN. 백분을 두상둘레 백분을	4	· 사		
검청 시 발 적 대 행정 신외 피 머 눈 귀 코 구목 결 전 등 전 기 코 구목 결 절 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	사	중그라미로 표하십시오. 등력/의사소통 성/정서적 사항 소 운동근욱(신경 정상 중부 폐 심장혈관/맥박 복부 생식기 척추 수족(손발) 신경 걸음걸이	수 보 경	면	B4 TB(결 ^호 가였거나/제공된 모- 배설훈련 (대소변기	남성분 노출 처리 취)
진찰자 서			진칠	· 자(진료윈) 주소		
DSHS 13-68	84 KO (REV. 08/2004)					구술 참조

유년기 초기: 18개월

18개월 아동의 건강

성장 과도기

18개월에서 24개월 사이의 아이 발욱 범위들

최소한 한 두 낱말로 말합니다.

5 혹은 6 개씩 블록을 쌓습니다

공을 차고 던집니다.

컵, 스푼, 포크를 사용할 줄 압니다.

두 단계의 지시사항을 따라 합니다.

크레용으로 직선으로 또는 윈을 그리려고 합니다

아이가 새로운 기술을 배우는 데 도움이 되도록 아이와 대화하고 놀아줍니다.

도움이나 상세한 정보를 원할 때

아동의 건강과 발달 예방접종:

Healthy Mothers, Healthy Babies 정보와 의뢰기관 전화번호, 1-800-322-2588 (음성) 혹은 1-800-833-6388 (TTY 자막)

카-시트에 관한 문의사항: Safety Restraint Coalition, 1-800-BUCK-L-UP.

양육기술과 지원정보: 가족 헬프 전화번호, 1-800-932-HOPE (4673) Family Resources Northwest, 1-888-746-9568 지역 커뮤니티 칼리지 강좌

건강정보

자녀가 자라감에 따라 차후 건강진단 시기는 점차 간격적으로 있게 됩니다. 언제 건강진단을 하는 것이 가장 좋은지 의사나 간호원에게 문의하십시오. 진단일이 아니더라도 언제든지 염력사항이 있으면 의사나 간호원에게 전화하여 문의하십시오.

자녀에게 필요한 예방접종을 다 하였는지 확인합니다. 그렇지 못하였다면 즉시 예약하여 예방접종을 하도록 하십시오. 심각한 질병으로부터 최상의 보호를 받으려면 예방접종을 모두 갖출 필요가 있습니다.

자녀의 식욕이 이전에 비해 다소 떨어질 수도 있습니다. 다양한 건강식품을 주고 식사 양은 자녀가 정하도록 하십시오. 그릇에 담긴 음식을 전부 다 먹어야 된다고 강요해서는 안 됩니다.

하루에 밀크, 요구르트 2컵, 치즈 3조각 정도이면 충분합니다. 저지방 음식은 2살무렵까지 삼가하십시오.

양육 정보

아이마다 그 성장속도가 다르지만 자녀를 가장 잘 아는 사람은 부모입니다. 발육상태가 좋지 못하다고 생각이 들면 무료 검사를 받을 수 있습니다. HMHB(왼쪽에 있는 전화번호 사용)으로 전화하여 가족 리소스 담당자에게 연락하십시오.

안전정보

어린 아이들은 종종 넘어져 사고를 당합니다. 자녀를 안전한 놀이터로 데리고 가십시오. 패딩, 모래 혹은 목재 부스러기가 깔려 있는 놀이터(장난기구)를 찾아 봅니다. 아이가 삼킬 수 있는 작은 장난감이 있는지를 살펴 보고, 아이가 노는 동안 가까이서 주시합니다.

카-시트에 앉아 있지 않으려고 할 수 있습니다. 이를 들어주면 앞으로도 계속해서 앉지 않겠다고 떼를 쓸 수 있으므로 무시하는 것이 좋습니다.

- 그래도 아이가 계속 떼를 쓰면 단호히 차량을 일단 정지시켜 카-시트에 버클하여 앉아 있을 때까지 차량을 움직이지 않습니다.
- 즐길 수 있는 부드러운 장난감, 그림책 등을 가져 가거나 음악을 틀어 줍니다.
- 자녀뿐 아니라 부모도 차량좌석밸트를 매어야 합니다